

Serología Adenovirus	
MÉTODO	Inmunofluorescencia indirecta.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativo.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

### Comentarios:

La elevación de anticuerpos comienza una semana después de la infección, debiéndose extraer la primera muestra cuanto antes.

Recoger dos muestras con intervalo de 2 a 4 semanas.

Un incremento del título en cuatro o más veces posee significación clínica y sugiere infección en curso.

No es posible detectar respuesta serológica en todos los procesos agudos, especialmente en lactantes y niños.

Las inmunoglobulinas fijadoras del complemento son las que disminuyen en primer lugar desapareciendo en un período estimado de 12 meses, mientras que los anticuerpos neutralizantes pueden persistir muchos años con títulos estables.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Cistitis hemorrágica aguda	▲
Conjuntivitis	▲
Diarrea del lactante	▲
Enfermedad del SNC	▲
Faringitis	▲
Neumonía	▲
Úlceras genitales	▲
Uretritis	▲